

Национальный календарь профилактических прививок — документ, утверждаемый Приказом Министерства здравоохранения РФ и определяющий сроки и типы вакцинаций проводимых бесплатно и в массовом порядке в соответствии с программой ОМС.

Действующая редакция Национального календаря профилактических прививок принята Приказом № 229 от 27.06.2001 (с изменениями от 30.10.2007года) Минздравсоцразвития РФ и включает следующие прививки:

Национальный календарь профилактических прививок		
Возраст	Наименование прививки	<u>Вакцина</u>
Новорождённые (в первые 12 часов жизни)	Первая вакцинация против <u>вирусного гепатита В</u>	
Новорождённые (3—7 дней)	Вакцинация против <u>туберкулёза</u>	<u>БЦЖ-М</u>
3 месяца	Вторая вакцинация против <u>вирусного гепатита В</u> Первая вакцинация против <u>дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита</u> <u>АКДС</u>	
4,5 месяца	Вторая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита	АКДС
6 месяцев	Третья вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита Третья вакцинация против вирусного гепатита В	АКДС
12 месяцев	Вакцинация против <u>кори, краснухи, эпидемического паротита</u>	
18 месяцев	Первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита	АКДС
20 месяцев	Вторая ревакцинация против полиомиелита	
6 лет	Ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита	
7 лет	Ревакцинация против туберкулёза Вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка	<u>БЦЖ</u> <u>АДС</u>
13 лет	Вакцинация против краснухи (девочки) <u>Вакцинация против вирусного гепатита В (ранее не привитые)</u>	
14 лет	Третья ревакцинация против дифтерии, столбняка Ревакцинация против туберкулёза Третья ревакцинация против полиомиелита	АДС <u>БЦЖ</u>
Взрослые	Ревакцинация против дифтерии, столбняка — каждые 10 лет от момента последней ревакцинации	АДС

Дополнительная иммунизация населения против гепатита В, краснухи, полиомиелита инактивированной вакциной и гриппа		
Возраст	Наименование прививки	Вакцина
Дети от 1 до 17 лет, взрослые от 18 до 35 лет, не привитые ранее	<u>Вакцинация против вирусного гепатита В</u>	
Дети от 5 до 17 лет, девушки от 18 до 25 лет	Вакцинация против краснухи лиц, не болевших и не привитых ранее	

<p>Дети раннего возраста с клиническими признаками иммунодефицитного состояния (частые гнойничковые заболевания); ВИЧ-инфицированные или рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей; с установленным диагнозом онкогематологических заболеваний и/или длительно получающие иммуносупрессивную терапию; дети, находящиеся на 2 этапе выхаживания и достигшие 3-месячного возраста; воспитанники домов ребенка (вне зависимости от состояния здоровья); дети из семей, где имеются больные с иммунодефицитными заболеваниями</p>	<p>Вакцинация против полиомиелита инактивированной вакциной</p>	
<p>Дети, посещающие дошкольные учреждения, учащиеся 1—4 классов, медицинские работники, работники образовательных учреждений, взрослые старше 60 лет</p>		